

действиями людей. В южной лесостепи большие веретенники появляются во второй половине апреля и вскоре после прилёта приступают к размножению (Гынгазов, Миловидов 1977; Блинова, Блинов 1997). Поэтому весенние пожары на сенокосных угодьях приводят к гибели кладок, а также резко изменяют кормовые и общие экологические условия гнездовых станций этого вида куликов.

Литература

- Блинова Т.К., Блинов В.Н. 1997. *Птицы Южного Зауралья: степь и лесостепь. Фаунистический обзор и охрана птиц*. Новосибирск: 1: 1-297.
- Гагина Т.Н., Скалон Н.В. 2012. Веретенник большой *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758) // *Красная книга Кемеровской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных*. Кемерово, 2: 148.
- Гынгазов А.М., Миловидов С.П. 1977. *Орнитофауна Западно-Сибирской равнины*. Томск: 1-351.
- Кассал Б.Ю. 2015. Большой веретенник *Limosa limosa* Linnaeus, 1758 // *Красная книга Омской области*. Омск: 252-253.
- Красная книга Новосибирской области. Животные, растения и грибы*. 2018. Новосибирск: 1-588.
- Красная книга Омской области*. 2015. Омск: 1-636.
- Красная книга Томской области*. 2023. Томск: 1-579.
- Москвитин С.С. 2002. Большой веретенник – *Limosa limosa* Linnaeus, 1758 // *Красная книга Томской области*. Томск: 82-83.
- Юрлов А.К. 2018. Большой веретенник *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758) // *Красная книга Новосибирской области. Животные, растения и грибы*. Новосибирск: 251-252.



ISSN 1026-5627

Русский орнитологический журнал 2025, Том 34, Экспресс-выпуск 2511: 1226-1228

Нетипичное гнездование огаря *Tadorna ferruginea* в Алтайском крае

С.В.Важов, Б.Д.Коновалов, А.Л.Верещагин, В.М.Важов

Сергей Викторович Важов, Виктор Маркович Важов. Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул, Россия. E-mail: vazhov49@mail.ru

Борис Дмитриевич Коновалов, Александр Леонидович Верещагин. Село Берёзовая роща, Зональный район, Алтайский край, Россия

Поступила в редакцию 6 марта 2025

В нежилой части села Берёзовая роща Зонального района Алтайского края пара огарей *Tadorna ferruginea* два года гнездилась на территории действующей пасеки (рис. 1). Птицы соорудили гнездо на полу внутри редко посещаемого сарая, имеющего открытый дверной проём. Пасека находится вблизи небольшого слабо заросшего пруда. Недалеко от пасеки, около болота, гнездились дикие утки других видов.



Рис. 1 (слева). Огари *Tadorna ferruginea* на пасеке весной 2023 года. Фото А.А.Верещагина

Рис. 2 (справа). Гнездо огаря *Tadorna ferruginea* в сарае в 2023 году. Фото А.А.Верещагина

В 2023 году самка отложила 8 яиц (рис. 2), благополучно вывела и увела на водоём 8 птенцов. Все они встали на крыло и в начале осени улетели на зимовку. Самка огаря доверчиво относилась к пасечнику, так как не испытывала беспокойства с его стороны, но посторонних людей не подпускала, при их появлении улетала. Самец в сарай не залетал, но постоянно находился неподалёку на гнездовом участке.



Рис. 3 (слева). Обогрев пуховых птенцов огаря *Tadorna ferruginea* в 2024 году. Фото А.А.Верещагина

Рис. 4 (справа). Птенцы огаря *Tadorna ferruginea* в вольере вместе с домашними птицами в 2024 году. Фото А.А.Верещагина

В 2024 году пара огарей прилетела на пасеку в конце апреля. Самка вновь успешно загнездилась и на прежнем месте в сарае отложила 11 яиц. Самец, как и в прошлый год, в сарае не появлялся, но всегда находился поблизости на гнездовом участке.

В этот год перед уходом на кормёжку утка очень активно переворачивала яйца в гнезде, они ударялись друг о друга, скорлупа трескалась, в повреждённых яйцах зародыши погибали. Битые яйца самка выкидывала из гнезда, что типично для уток, так как яйца становились непригодными для выведения утят. Когда из 11 отложенных яиц в гнезде осталось только 4 целых и самка по непонятной причине бросила гнездо, оставшиеся яйца, чтобы их сохранить, пасечник поместил в верхнюю, изолированную от пчёл часть улья. Здесь за счёт жизнедеятельности пчелосемьи поддерживалась постоянная влажность и температура. В «инкубаторе» все 4 птенца благополучно вылупились. Затем пуховичков перенесли в обогреваемую картонную коробку (рис. 3), где они подросли и были выпущены в вольер к домашним птицам (рис. 4).

Утята на птичьем дворе чувствовали себя хорошо, общались и кормились с домашними птицами, подросли и когда их выпустили из вольера в свободный двор, стали проявлять любопытство, исследовали окрестности (рис. 5). Людей не боялись.




Рис. 5. Молодые огари *Tadorna ferruginea* в окрестностях пасеки в 2024 году.
Фото А.А.Верецагина

Встав на крыло, в конце июля улетела со двора первая из четырёх утка, и больше не появлялась. В начале августа улетели остальные три, но все эти особи несколько дней возвращались назад – на птичий двор, кормились вместе с домашними птицами, ночи проводили в помещении птичьего двора. Затем покинули пасеку и не появились больше.

